

Vier-Felder-Tafel



Komplexität

| | |
|--|---|
| <p>3. RTW : Schnellstmöglicher RTW der ÖrV Notarzt: Schnellster NA der ÖrV (NEF, RTH) Erstversorgung: geeignetes Einsatzmittel (z.B. Organisierte EH, SEG, KTW)</p> <ul style="list-style-type: none">- Akute Schlaganfallsymptome mit Bewusstseinstörung- schlagartig aufgetretene stärkste Kopfschmerzen- Blutdruckentgleisung mit Symptomatik- Ausgeprägte Schockzeichen- neurologische Ausfälle mit Bewusstseinsstörung (siehe Gruppe 10-10), anhaltender Krampfanfall, mehrere Krampfanfälle in Folge- Verletzungen mit vermuteter vitaler Bedrohung (Anhand Mechanismus „B-Kriterien“)- Hieb-, Schuss-, Stichverletzung außerhalb des Torso | <p>1. RTW : Schnellstmöglicher RTW der ÖrV Notarzt: Schnellster NA der ÖrV (NEF, RTH, VEF, ITW, ITH) Erstversorgung: Ggf. Zweit- /Außennotarzt, geeignetes Einsatzmittel (z.B. Organisierte EH, SEG, KTW) - Laien-Ersthelfer bei *</p> <ul style="list-style-type: none">- Verletzungen mit vitaler Bedrohung- Massive äußere Blutung (*)- Hieb-, Schuss-, Stichverletzung im Kopf oder Torso- rasch zunehmende Bewusstseinsstörung oder Bewusstlosigkeit- rasch zunehmende Atemstörung und ausgeprägte Atemnot mit Hinweiszeichen- Akuter Brustschmerz mit zusätzlicher relevanter Symptomatik- Atem-, Kreislaufstillstand, Schnappatmung (*)- Schwere Anaphylaxie |
| <p>4. RTW : Schnellstmöglicher RTW der ÖrV Notarzt: Schnellster bodengebundener NA der ÖrV (NEF) Erstversorgung: Keine</p> <ul style="list-style-type: none">- Stärkere Schmerzen ohne vitale Bedrohung- Stoffwechsellentgleisung mit klinischer Symptomatik, gastrointestinale oder gynäkologische Blutung, Nasenbluten jeweils mit Potenzial einer Vitalbedrohung- Entgleisungen der Körpertemperatur mit Potenzial einer Vitalbedrohung- Intoxikation mit Potenzial einer Vitalbedrohung- Manifeste oder drohende Gefährdung von Menschenleben | <p>2. RTW : Schnellstmöglicher RTW der ÖrV Notarzt: Schnellster NA der ÖrV (NEF, RTH) Erstversorgung: Keine</p> <ul style="list-style-type: none">- Arrhythmie mit Symptomatik- AICD/SM – Fehlfunktion- Unerträglicher Schmerzzustand- psychiatrischer Zustand mit erheblicher Selbst- oder Fremdgefährdung, Suizid/ -versuch- Wehenabstand <3 Minuten, einsetzende oder stattgefundene Geburt- Akuter Brustschmerz ohne relevante zusätzliche Symptomatik- zunehmende Atemstörung mit Hinweiszeichen |

Dringlichkeit